

ไก่อាកาสาหัทสจากสุนัขกัด....รอดจ๊ะ

ที่มา: Facebook โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตวใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



น้องโต้ง: ไก่เพศผู้ตัวน้อยที่สู้ชีวิต



เจ้าของได้พาน้องมาที่โรงพยาบาล เนื่องจากน้องโดนสุนัขกัดเมื่อช่วงเช้า พบมีบาดแผลตามลำตัว



สัตวแพทย์ได้เข้าตรวจรักษา น้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ผิดกับรอยแผลที่พบตามตัวหลายตำแหน่ง แต่ก็ไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากสภาพของน้องที่พบ อาจเกิดจากการที่ร่างกายปรับสภาพต่อความเจ็บปวด



สัตวแพทย์รับทำการรักษา โดยให้ยาลดปวด ลดอักเสบ ก่อนที่จะลงมือทำหัตถการเย็บปิดบาดแผลที่เกิดจากสุนัขกัด

ขณะทำการผ่าตัด ต้องมั่นใจว่าแผลที่ทำความสะอาด จะไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เพราะว่าการถูกสุนัขกัด ทำให้แผลเกิดความสกปรกจากน้ำลาย โดยในน้ำลายมักมีการสะสมของจุลินทรีย์ และเชื้อโรคต่างๆ ทางการแพทย์จำแนกชนิดของแผลออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ

1. แผลสะอาด คือ แผลที่เกิดขึ้นไม่เกิน 6 ชั่วโมง และต้องไม่มีการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม แผลชนิดนี้สามารถเย็บปิดได้

2. แผลสกปรก คือ แผลที่มีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม หรือ แผลเนื่อตาย แผลชนิดนี้สามารถเย็บปิดได้ แต่ต้องมีการใส่ท่อระบาย

3. แผลติดเชื้อ คือ แผลที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 ถึง 2 วัน โดยมีการติดเชื้อ หรือ เกิดเนื่อตายวงกว้าง ซึ่งแผลชนิดนี้ไม่สามารถเย็บปิดได้ต้องทำการรักษาแบบเปิด





หลังการผ่าตัด น้องได้ยาลดปวด และยาปฏิชีวนะกลับไปกินที่บ้าน และแจ้งเจ้าของให้ระวัง
สภาพแวดล้อมที่จะปนเปื้อนแผลได้ จำกัดพื้นที่จนกว่าแผลจะหายดี



นัดตรวจดูอาการหลังผ่าตัด พบว่า แผลไม่มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แขนงโน้มไปในทิศทางที่ดี จึงได้นัด
ตัดไหม ภายหลังการผ่าตัด 10 วัน เจ้าของพาน้องมาตัดไหม สภาพแผลดี เนื้อเยื่อกลับมาปกติ กินดี รูปร่าง
สมบูรณ์



สุดท้าย การประเมินสภาพแผลไม่ควรรักษาเอง ควรให้สัตวแพทย์พิจารณาก่อนทำการรักษา
และควรมีการป้องกันต้นตอของปัญหาเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

