



ลูกควายสะดืออักเสบ

ที่มา: Facebook โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


น้องควายหมูหยองอายุ 5 วัน

: น้องควายหมูหยองมาโรงพยาบาลฯ ด้วยอาการซึม กินนมน้อยลง และมีหนองออกบริเวณสะดือ เจ้าของพามาให้พี่หม่อรักษา เนื่องจากน้องหมูหยองยังกินนมแม่อยู่ เจ้าของจึงพามาควายมาอยู่ให้กำลังใจลูกชายที่โรงพยาบาลฯ ด้วย

: หลังจากเข้ารับการรักษาและแอดมิทน้องหมูหยองกลับมาเราเร็ว และกลับมากินนมได้เป็นปกติ 😊

: อาการสะดืออักเสบในลูกโคและควายเป็นภาวะที่มักพบหลังคลอด เกิดจากการอักเสบติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุคร่าวๆ เช่น

- ตัดสายสะดือยาวเกินไป
- แม่เลียบริเวณสะดือ
- บริเวณพื้นคอกไม่สะอาด
- ไม่มีการจุ่มสะดือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในช่วงต้นของการคลอด

: การดูแลสะดือหลังคลอดเป็นสิ่งสำคัญ สามารถทำได้ด้วยการล้างสะดือด้วย Betadine 10% หรือ Chlorhexidine solution หรือ ทิงเจอร์ไอโอดีน ประมาณ 7-10 วัน จนสะดือของลูกสัตว์แห้งและหลุดไปเอง

