

ภาวะเต้านมอักเสบ

ที่มา: Facebook โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตวใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

แม่โคดวงใจมาด้วยอาการเต้านมอักเสบ🐄👉 หลังจากสัตวแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้ว ได้แอดมิทเพื่อรับการรักษา 1 สัปดาห์เต็ม สัตวแพทย์ก็พิจารณาให้แม่ดวงใจกลับบ้านได้😊

👤🐄: เต้านมอักเสบจะทำให้ให้น้ำนมคุณภาพลดลง สังเกตได้จากเต้านม บวม เต่ง แดงและร้อน สีน้ำนมจะเปลี่ยนไปและอาจมีตะกอน ข้น และเหนียวกว่าปกติ และควรได้รับการรักษาทันทีที่พบภาวะเต้านมอักเสบ

👤🐄: สาเหตุของการเกิดเต้านมอักเสบมี 2 แบบ ดังนี้

1. ติดเชื้อจากเต้านมสู่เต้านม โดยติดเชื้อจากแม่ที่เต้านมอักเสบ เชื้อสามารถปนออกมากับน้ำนม และติดต่อไปสู่เต้านมตัวอื่นๆ ผ่านทางเครื่องรีดนม ผ้าเช็ดเต้า น้ำนม และมือของผู้รีดนม เชื้อก่อโรคหลัก ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Streptococcus agalactiae

2. ติดเชื้อแบคทีเรียที่พบในสิ่งแวดล้อม เช่น คอก โรงเรือน พื้น อุจจาระโค ดิน และในพืชอาหารสัตว์ เชื้อที่สามารถติดต่อเข้าสู่เต้านมและทำให้เกิดเต้านมอักเสบ ได้แก่ Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella pneumoniae และ Enterobacter spp.

👤🐄: การรักษาเต้านมอักเสบจะเน้นการลดเชื้อแบคทีเรียและการอักเสบในเต้านมให้ได้มากและเร็วที่สุด การรักษาเต้านมอักเสบต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน จึงจะประสบผลสำเร็จ

1. เก็บตัวอย่างน้ำนมเพื่อส่งตรวจ Drug sensitivity เพื่อดูความไวต่อยาปฏิชีวนะ
2. รีดนมออกบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในน้ำนม
3. การใช้ยาสอดเต้าที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะและยาลดอักเสบสอดเข้าเต้านม
4. การใช้ยาปฏิชีวนะและยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดดำ

ในกรณีที่มีการอักเสบอย่างรุนแรงเพื่อให้การรักษาได้ผลดีมากยิ่งขึ้นการรักษาเต้านมอักเสบนั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงเน้นการควบคุมและป้องกันโรคเป็นหลักจะดีกว่า

